INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE · GENERAL

Conducir y sus medicamentos

EM Orbit

Hoy le dieron, o le recetaron, un medicamento que puede afectar su capacidad para conducir con seguridad. Esta hoja explica qué medicamentos pueden hacerlo, cuánto tiempo esperar y cómo mantenerse seguro en la carretera.

¿Qué es?

Algunos medicamentos dan sueño, retrasan sus reacciones, nublan la vista o producen mareo. Entre ellos están los analgésicos fuertes, la sedación que se da para un procedimiento, algunas pastillas para la alergia, las pastillas para dormir, las pastillas contra las náuseas y algunos medicamentos para la ansiedad, el ánimo o las convulsiones. El alcohol empeora mucho estos efectos. Puede sentirse bien y aun así no ser seguro que conduzca.

Cómo cuidarse en casa

- No conduzca, no monte en moto ni en bicicleta, ni use máquinas durante al menos 24 horas después de una sedación o una anestesia.
- Pida a un adulto que lo lleve a casa hoy y que se quede con usted si le pusieron sedación.
- Lea la etiqueta de cada medicamento. Si advierte de somnolencia, no conduzca hasta saber cómo le afecta.
- No beba nada de alcohol mientras toma estos medicamentos.
- No conduzca si siente sueño, mareo, confusión o tiene la vista borrosa.
- Evite también tomar decisiones importantes o firmar documentos durante 24 horas después de una sedación.

Medicamentos

- Tome sus medicamentos solo como le indicó su médico o como dice el envase. No tome dosis extra.
- Pregunte a su farmacéutico si el medicamento nuevo se puede mezclar con seguridad con los que toma habitualmente.
- No deje un medicamento que necesita solo para poder conducir. Hable antes con su médico.

Seguimiento

- Acuda a su médico de familia o centro de salud si no sabe cuándo es seguro volver a conducir.
- Si su propia enfermedad, como una convulsión o un desmayo, afecta a la conducción, pida consejo a su médico de familia antes de conducir.

Vuelva a urgencias o llame a una ambulancia de inmediato si:

- **Mucho sueño y es difícil despertarlo**
- **Respiración lenta, superficial o ruidosa**
- **Confusión nueva o comportamiento inusual**
- **Hinchazón de la cara, los labios o la lengua, o dificultad para respirar después de un medicamento nuevo**
- **Desmayo o colapso**
- **Tomar más medicamento del recetado, por error o a propósito**

Escanee para leer esta hoja en su teléfono

Este folleto es información general que apoya los consejos que le dio hoy su médico o enfermera. No los sustituye. Si está preocupado, busque ayuda médica. Traducido del original en inglés; prevalece la versión inglesa.